Interpretasi cone beam computed tomography 3-dimension dalam pemasangan implan dental di Rumah Sakit Gigi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran (*Interpretation of cone beam computed tomography 3-dimension in inserting dental implant at Dental Hospital of Faculty of Dentistry Padjajaran University*)

Farina Pramanik, Ria N. Firman

Bagian Radiologi Kedokteran Gigi
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran
Bandung, Indonesia

ABSTRACT

Radiographic examination is one of the examinations required in determining the treatment plan and evaluating the success of dental implant placement. Cone beam computed tomography 3D (CBCT 3D) is a tool that produce radiographic imaging in three dimensions that can meet the information needed by dentists/specialists in dental implant placement. This report discusses the role of interpreting the CBCT 3D bone area, indication of dental implant with give a sight 3D, measure the distance and position of the implant and to assess the quality of the bone at dental implant placement. Interpretation of CBCT 3D case is the size of the dental implant alveolar bone morphometric teeth region 46 and 37 qualified radiographically for dental implants. The conclusion of this paper is a CBCT 3D can be a determinant of the success of dental implant placement as capable of being able to analyze a complete, clear and more accurate measurement through a 3D picture, the analysis of the size/3D morphometric, density analysis, and histogram/ trabecular analysis.

Key word: *interpreting, CBCT 3D, dental implant, Dental Hospital of Faculty of Dentistry Padjajaran University*

ABSTRAK

Pemeriksaan radiografi merupakan salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan dalam menentukan rencana perawatan dan evaluasi keberhasilan pemasangan implan dental. *Cone beam computed tomography 3-dimension* (CBCT 3D) merupakan alat radiografi yang menghasilkan pencitraan secara 3-dimensi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam pemasangan implan dental. Makalah ini melaporkan hasil interpretasi secara tiga dimensi untuk pemasangan implan dental melalui CBCT 3D. Salah satu indikasi pemasangan implan dental adalah pasien memiliki kualitas tulang yang cukup untuk penempatan implan. Hasil interpretasi dari CBCT 3D dapat menilai kualitas tulang rahang yang merupakan indikasi utama pemasangan implan dental. Selain itu dapat menentukan posisi penempatan implan dental, jarak implan dengan anatomi rahang, mengukur kepadatan tulang rahang, mengukur tebal tulang rahang dengan lebih akurat jika dibandingkan dengan gambaran radiografi dua dimensi. Dari interpretasi kasus yang akan dipasangkan implan, disimpulkan bahwa CBCT 3D dapat menginterpretasi implan dental karena mampu menganalisis secara lengkap, jelas, dan pengukurannya lebih akurat melalui gambaran secara 3-dimensi, analisis ukuran/morfometrik 3D, analisis densitas, dan analisis histogram/pola trabekular sehingga rencana perawatan dapat dilakukan dengan tepat dan keberhasilan perawatan tercapai.

Kata kunci: interpretasi, CBCT 3D, Implan dental, Rumah Sakit Gigi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran

Koresponden: Farina Pramanik, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Jl. Sekeloa Selatan No.1, Bandung, Indonesia. E-mail: iyank_drg@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pemeriksaan radiologis merupakan salah satu pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menentukan rencana perawatan bahkan keberhasilan pemasangan implan dental. *Cone beam computed tomography 3- dimension* (CBCT 3D) merupakan alat radiografi yang beresolusi tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pemasangan implan dental.

Alat tersebut menghasilkan pencitraan secara tiga dimensi yang meliputi bidang aksial, koronal dan sagital serta dapat mengukur densitas tulang. Hasil yang diperoleh berupa grafik densitas dengan nilai maksimal dan minimal, serta perbedaan pemetaan

warna untuk memberi nilai kepadatan tulang rahang dari setiap *voxel* serta dapat divisualisasikan sehingga dapat mengukur kualitas tulang.¹

Aplikasi alat CBCT 3D dalam bidang kedokteran gigi dapat digunakan pada saat pemasangan implan, pemeriksaan kelainan oromaksilofasial dan sendi temporomandibula, bedah ortognatik, kasus gigi impaksi, kelainan tulang, trauma pada rahang atas dan bawah, dan evaluasi penyakit sinus.^{2,3}

Salah satu faktor yang berperan penting dalam pemasangan implan dental adalah keakuratan dari perhitungan kualitas dan kuantitas tulang rahang agar menentukan apakah pasien merupakan indikasi atau

kontraindikasi, rencana perawatan, serta evaluasi keberhasilan pemasangan implan dental.⁴⁻⁶

Sayangnya penggunaan alat ronsen termasuk CBCT 3D oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis masih rendah. Kegagalan dan komplikasi pemasangan implan juga masih banyak terjadi. Di negara maju tingkat kegagalan yang terjadi dilaporkan mencapai 20%.⁷ Kegagalan dan komplikasi implan salah satunya dapat disebabkan oleh kurang tepatnya penempatan implan dan faktor biologis. Faktor biologis, yaitu kualitas tulang yang buruk, tidak cukupnya volume tulang, kesalahan perencanaan dalam penempatan implan, dan kesalahan dalam menilai anatomi tulang, yang mengakibatkan terhambatnya oseointegrasi. Komplikasi yang fatal, yaitu terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh perforasi tulang padat yang biasanya terjadi di daerah lingual mandibula.⁸

Gagalnya pemasangan implan dental tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, melainkan juga mempengaruhi kondisi tulang rahang pasien yang bahkan secara psikologis dapat berdampak buruk pada pasien.⁷ Penempatan implan ke dalam rahang mempunyai risiko tinggi; jika perencanaannya tidak tepat dan tidak akurat akan menyebabkan kerusakan struktur anatomis seperti kanalis mandibularis dan sinus maksilaris.⁴⁻⁶ Risiko yang dapat menyebabkan kegagalan perawatan implan dental tersebut harus diantisipasi dengan melakukan rencana perawatan yang tepat dan akurat.^{7,9} Untuk mendukung rencana perawatan yang tepat diperlukan informasi dari hasil interpretasi yang berasal dari teknologi digital dengan resolusi tinggi seperti CBCT 3D.⁴⁻⁶ Praktisi implan dapat memeriksa dari berbagai aspek secara akurat dan lebih jelas dalam satu kali pengambilan gambar saja, melalui CBCT 3D.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada artikel akan dibahas secara lengkap mengenai hasil interpretasi radiografi 3 dimensi dalam pemasangan implan dental melalui CBCT pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Padjadjaran, sehingga diharapkan dokter gigi atau dokter gigi spesialis dapat memanfaatkan CBCT 3D untuk

kelancaran perawatan dan keselamatan, serta kepuasan pasien.

KASUS

Seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke Instalasi Radiologi Kedokteran Gigi di RSGM Unpad membawa surat konsul dengan diagnosis klinis edentulus gigi 46 dan 37. Pasien rencana dirawat dengan pemasangan implan dental 46 dan 37, dan permintaan untuk dilakukan radiografi CBCT 3D.

PENATALAKSANAAN

Alat CBCT 3D yang digunakan di RSGM FKG Unpad (*Picasso Trio*) memiliki kombinasi *cone beam* serta *focal spot* sehingga menghasilkan radiografi dengan resolusi tinggi. Selain itu, pada alat radiografi ini dapat diaplikasikan tiga teknik, yaitu radiografi panoramik digital, sefalometri, dan radiografi tiga dimensi.¹¹

Tahap-tahap interpretasi implan dental melalui CBCT 3D adalah 1) pasien diberi paparan radiasi, 2) hasil foto langsung bisa dilihat pada komputer, 3) membuka program *EZ-plant* atau *EZ-dent*, 4) terlihat 4 gambaran yaitu dimensi aksial, sagital dan koronal, serta gambaran secara 3 dimensi, dan 5) melakukan pengeditan pada gambar yang ada pada komputer dengan program *EZ-plant* atau *EZ-dent*.

Pengukuran yang dilakukan pada dimensi aksial adalah lebar ruangan, densitas, dan kelengkungan rahang (gambar 1).

Pengukuran kualitas tulang yang dilakukan pada dimensi koronal (gambar 2) adalah lebar ruangan tersisa untuk pertumbuhan tulang alveolaris di aspek palatal dan bukal, beserta densitas tulangnya, jarak dari ujung implan ke dinding dasar sinus maksilaris, kemiringan implan terhadap tulang alveolaris dan daya kunyahnya, perbandingan panjang serta lebar implan dengan panjang dan lebar tulang alveolaris tempat implan, dan pengukuran panjang implan yang berada di dalam dan di luar tulang alveolaris, serta tebal ruangan yang tersedia untuk bakal restorasi mahkotanya.

Gambar 1 Dimensi aksial gambaran radiograf CBCT 3D; **A** jarak mesiodistal dan bukolingual pada daerah edentulus gigi 36, **B** densitas pada area edentulus gigi 36

Gambar 2 Dimensi koronal gambaran radiograf CBCT 3D; **A** mengukur jarak bukolingual pada daerah edentulus gigi 36 dan mengukur jarak puncak tulang alveolar ke kanalis mandibularis pada daerah gigi 36, dan **B** mengukur densitas secara bukolingual pada daerah gigi 46

Gambar 3 Dimensi sagital gambaran radiograf CBCT 3D; **A** mengukur jarak mesiodistal dan ketinggian dari puncak tulang alveolar ke kanalis mandibula pada edentulus gigi 46, **B** mengukur densitas mesiodistal pada daerah gigi 46

Pengukuran yang dilakukan pada dimensi sagital (gambar 3) adalah lebar ruangan yang tersisa untuk pertumbuhan tulang alveolar di sisi mesial dan distal beserta densitasnya, perbandingan kemiringan implan dengan gigi-gigi tetangganya, serta lebar dan tinggi ruangan yang tersedia untuk mahkota pengganti.

Gambar 4 Gambaran tiga dimensi daerah edentulus gigi 46

Gambar 4 menampilkan interpretasi radiografi CBCT 3D dengan analisis ukuran/morfometrik gigi 46 adalah 1) dimensi koronal adalah jarak bukal ke lingual minimal 6,90 mm dan maksimal 12,90 mm; 2) dimensi sagital ialah jarak mesial ke distal minimal 10,25 mm dan maksimal 11,99 mm, jarak puncak lingir alveolaris ke apikal 10,01 mm, dan jarak puncak lingir alveolaris ke kanalis mandibularis 16,32 mm; 3) dimensi aksial ialah jarak bukal ke lingual minimal 10,00 mm dan maksimal 12,7 mm, jarak mesial ke distal 6,74 mm.

Sedangkan analisis ukuran/morfometrik region 37 adalah 1) dimensi koronal adalah jarak bukal ke lingual minimal 6,36 mm dan maksimal 11,56 mm; 2) dimensi sagital adalah jarak dari mesial ke distal minimal 10,64 mm dan maksimal 12,66 mm, jarak dari puncak lingir tulang alveolaris ke apikal 10,07 mm, dan jarak puncak lingir alveolaris ke kanalis mandibularis 13,77 mm; 3) dimensi aksial ialah jarak dari bukal ke lingual minimal 11,36 mm dan maksimal 12,30 mm, dan jarak dari mesial ke distal 8,30 mm.

Hasil interpretasi radiograf CBCT 3D dengan analisis densitas region 46 adalah 1) dimensi koronal adalah nilai minimal 121 HU dan maksimal 811 HU, rerata 466 HU; 2) dimensi aksial adalah nilai minimal 172 HU dan maksimal 840 HU, rata-rata 551 HU. Sementara analisis densitas region gigi 37 adalah 1) dimensi koronal adalah nilai minimal 436 HU dan maksimal 849 HU, rata-rata 642,5 HU; dan 2) dimensi aksial adalah nilai minimal 249 HU dan maksimal 827 HU, rata-rata 538 HU.

Suspect radiodiagnosis dari kasus adalah ukuran morfometrik tulang alveolaris region gigi 46 dan 37 memenuhi syarat radiografis untuk implan dental, dan ukuran kualitas tulang alveolaris region 46 dan 37 memenuhi syarat radiografis untuk implan dental.

PEMBAHASAN

Radiograf yang dihasilkan alat CBCT 3D ini dapat menginterpretasi berbagai hal yang diperlukan,

antara lain memperlihatkan histogram, radiografi di bagian spesifik yang diinginkan dokter atau pasien, pengukuran jarak dan luas area, densitas, pengukuran jarak dari suatu ruangan ke irisan, suatu gambaran permukaan, intensitas modulasi, dan osteointegrasi (gambar 5).¹⁰

CBCT 3D termasuk teknologi baru sehingga memiliki beberapa kelebihan, yaitu dosis paparan lebih rendah, waktu paparan radiasi cepat, peralatan lebih kecil dan ringan, radiograf tiga dimensi dapat dimanipulasi, tersedia fasilitas mengukur panjang, derajat kemiringan, panjang lengkung rahang, derajat densitas tulang, dan sebagainya.¹⁰

Kelebihan dari CBCT, antara lain tampak lebih detail dalam mengganti struktur jaringan tulang sebab solusi kontras tinggi, tidak menimbulkan rasa nyeri, akurat dan non invasif, pemeriksaan cepat dan mudah, lebih komplit menghalangi terjadinya *superimposed* dari kesan struktur superfisial atau ke dalam area fokus pada pasien, merencanakan operasi pre-implan secara efektif, dan mengurangi waktu operasi sebagai hasil diagnostik yang akurat.¹²

Gambar 5A Skema kerja alat *computed tomography*, dan **B** alat CBCT 3D

CBCT 3D dapat mengatasi masalah radiografi yang telah ada sebelumnya, seperti kurang akuratnya pengukuran tebal tulang yang tersisa, kelengkapan detail jaringan keras, dosis radiasi yang cukup besar untuk pasien, dan tampilan struktur anatomi dari satu aspek saja dalam satu kali pengambilan gambar.^{10,12}

Kegunaan CBCT 3D dalam pemasangan implan dental mulai dari tahap awal hingga akhir. Tahap awal ketika pasien akan ditentukan apakah masuk indikasi atau tidak untuk pemasangan implan memerlukan pemeriksaan CBCT 3D yaitu dalam menilai kualitas tulang. Kualitas tulang rahang akan lebih akurat dinilai karena melibatkan kepadatan tulang dan ketebalan tulang yang sangat dibutuhkan pengukurannya dari segala bidang, yaitu aksial, sagital dan koronal dan posisi implan tersebut akan ditempatkan. Begitupula dengan pengukuran densitas, nilainya akan terlihat nilai maksimal, minimalnya tempat ruang kosong untuk pemasangan implan dental.

Pada tahap perencanaan, CBCT 3D berguna dalam pengukuran jarak ataupun tinggi, tebal, lebar suatu area. Ukuran implan bagi gigi insisivus, kaninus

dan premolar adalah 4,5-4,8 mm dan untuk gigi molar adalah 6 mm.¹³ Di instalasi radiologi FKG Unpad, jarak minimal mesiodistal, bukolingual adalah 8 mm dan jarak minimal dari puncak lingir alveolaris ke batas superior dari kanalis mandibularis atau dasar inferior sinus adalah 10 mm. Nilai densitas tulang yang aman untuk pemasangan implan dental berada pada kisaran 400-800 HU.

Dulu pengukuran jarak ini dilakukan secara manual, yaitu pada gambaran radiografi dua dimensi dan pada model gigi. Saat ini dengan adanya CBCT 3D pengukuran dilakukan secara langsung secara tiga dimensi melalui 3 bidang, yaitu aksial, sagital dan koronal pada area yang diinginkan. Hal ini akan mengurangi kesalahan paralaks yang dilakukan oleh pengukur, serta kesalahan alat jika menggunakan penggaris bila diukur secara manual sehingga hasil diperoleh lebih akurat. Dari gambaran radiografi dua dimensi hanya terlihat tinggi atau lebar tetapi tidak dapat terdeteksi densitas dan kualitas sebenarnya tulang tersebut. Selanjutnya, salah satu kekurangan foto panoramik ialah mengalami pembesaran gambar sehingga pengukuran menjadi tidak tepat sehingga dapat terjadi kegagalan dan komplikasi.

Sebagai contoh ketika menentukan jenis implan dental yang akan dipasang ke dalam tulang, karena pemilihan implan dapat berdasarkan lingir alveolar, yaitu berdasarkan lebar lingir dan kondisi tulang yaitu tinggi vertikal tulang.¹⁴ Berdasarkan hal di atas, terlihat begitu diperlukannya keakuratan pengukuran lebar lingir dan tinggi tulang, karena jika salah dalam pemilihan implan maka perawatan akan gagal atau terjadi komplikasi. Selain itu dapat menentukan posisi penempatan implan dental, jarak implan dengan anatomi rahang, mengukur kepadatan tulang rahang, mengukur tebal tulang rahang dengan lebih akurat jika dibandingkan dengan gambaran radiografi dua dimensi sehingga rencana perawatan dapat dilakukan dengan tepat dan keberhasilan perawatan tercapai.

Pada tahap evaluasi, CBCT 3D dapat melihat keberhasilan atau kegagalan perawatan; berhasil, yaitu jika terjadi osteointegrasi,^{15,16} terlihat dengan adanya gambaran radio-opak dari tulang trabekula dan kortikal yang terbentuk pada sekeliling implan.

Kriteria secara radiografis untuk menentukan keberhasilan suatu perawatan implan adalah derajat kemiringan pasak yang ditanam pada tulang hampir sebanding atau mendekati derajat kemiringan gigi tetangganya, biasanya $\pm 80^\circ$ untuk gigi molar dan hampir tegak lurus untuk gigi premolar; masih ada jaringan tersisa setelah penanaman; ketebalan ruang tersisa antara pasak dengan gigi tetangga pada bagian 1/3 servikal, medial dan apikal serta antara implan dengan daerah palatum, lingual, dan bukal yaitu 1-3

mm; jarak implan ke dinding dasar rongga sinus, biasanya $\pm 4-6$ mm untuk gigi molar dan $12-15$ mm untuk gigi premolar; implan ke kanalis mandibularis, biasanya $\pm 5-10$ mm; dan terjadinya osteointegrasi, biasanya setelah 4-16 minggu.^{17,18}

Komplikasi akibat pemasangan implan juga dapat dicegah karena salah satunya dapat ditimbulkan oleh faktor biologis yaitu kualitas tulang yang buruk, tidak cukupnya volume tulang dan penggunaan radiasi atau obat-obatan imunosupresif.¹⁹ Komplikasi juga dapat disebabkan oleh kesalahan penempatan implan, angulasi tidak tepat, penempatan implan terlalu dekat satu sama lain yang dapat menghambat terjadi osteointegrasi. Komplikasi yang fatal adalah perdarahan yang disebabkan oleh perforasi tulang padat biasanya di daerah lingual mandibula,¹⁴ yang dapat diantisipasi dengan pengukuran kualitas tulang pada CBCT 3D.

Kegunaan lainnya adalah dosis yang diterima lebih rendah karena pasien hanya memerlukan foto CBCT 3D saja, berbeda dengan dahulu pasien dilakukan foto periapikal, panoramik dan oklusal.

Kekurangan radiografi CBCT 3D adalah jaringan lunak, struktur otot, ligamen, posisi dari diskus dan perlekatanannya, serta meniskus tidak tergambarkan secara detail.¹² Kontraindikasi penggunaan CBCT

3D adalah pengambilan gambar pada pasien yang tidak mampu berdiri atau duduk, karena bentuk alatnya yang tidak memungkinkan pasien berbaring. Pada kasus pemasangan implan, CBCT 3D memiliki keterbatasan dalam mengukur densitas, karena nilai densitas yang muncul bukan nilai densitas pada area tertentu tetapi hanya pada garis yang dibuat pada saat interpretasi. Keterbatasan lainnya adalah tidak sesuai untuk kasus yang mengalami resorpsi anterior cukup besar.

Pada kasus ini diperoleh nilai morfometrik tulang alveolaris region gigi 46 dan 37 memenuhi syarat radiografis untuk implan dental karena keseluruhan jarak pada setiap dimensi nilai maksimalnya berada di atas 8 mm dan ukuran kualitas tulang alveolar region gigi 46 dan 37 memenuhi syarat radiografis untuk implan dental karena rata-rata nilai densitas di atas 400 HU.

Berdasarkan analisis interpretasi radiografi dan pembahasannya, disimpulkan bahwa CBCT 3D dapat menginterpretasi secara lengkap serta jelas karena pengukuran lebih akurat melalui gambaran secara tiga dimensi, analisis morfometrik tiga dimensi, dan analisis densitas dan histogram/pola dari trabekula sehingga rencana perawatan dapat dilakukan dengan tepat dan keberhasilan perawatan akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aya, Yajima. Cone beam CT (CB Throne) applied to dentomaxillofacial region. Bull Tokyo Dent Coll 2006; 47. Available at: www.tmjournals.com. Accessed on July 2007
2. Palomo. Reliability and accuracy of cone beam computed tomography dental measurement. Am J Orthod Dentofac Orthoped 2008; 19-25
3. Suomalainen A. The 3DX multi image micro-CT device in clinical dental practice. Available at: www.BritishInstituteofRadiology.com. Accessed on July 2012
4. Misch CE. Contemporary implant dentistry. 2nd Ed. St.Louis: Mosby; 1999. p.73-118
5. White SC, Pharaoh MJ. Oral radiology principles and interpretation. 5th Ed. St. Louis: Mosby; 2004. p.71-209
6. Mupparapu M, Sinner SR. Implant imaging for the dentist. J Can Dent Assoc 2004; 70 (1): 32
7. Nevins M, Mellonig JT. Implant therapy clinical approach and evidence of success. Illinois: Quintessence; 1998
8. McKinney RV. Endosteal dental implant. Toronto: Mosby Year Book; 1991
9. Niedermeler W. Dental implant failure and allergic reaction IADR implant prosthodontic & materials. Brisbane; 2006
10. Araki. Characteristics of a newly developed dentomaxillofacial X-ray cone beam CT scanner (CB MercuRayTM): system configuration and physical properties. Dentomaxillofacial Radiology 2004; 33: 51-9
11. Current Product Picasso Trio. Available at: www.1-wootech.com. Accessed on Juny 2012
12. Goaz PW, White SC. Oral radiology: principles and interpretation. 7th Ed. St.Louis: Mosby Company; 2003.p. 276-80
13. Palaci P. Esthetic implant dentistry: soft and hard tissue management. Illinois: Quintessence Publishing Co. Inc.; 2001
14. Straumann. Concept and surgical procedure: Straumann dental. Berlin: Quintessens Verlag; 1995.
15. Peterson EJ. Contemporary oral and maxillofacial surgery. St. Louis: Mosby Company; 1998
16. Chong W. Implantasia course handbook. <http://Implan-AsiaImplanet.com>. 1997
17. Grant G. Dental implants: teeth that look and feel like your own. Available at: www.perio.org. Accessed on April 2012
18. Johnstone G. Dental Implants. Available at: www.YourDentistryGuide.com. Accessed on April 2012
19. Worthington P. Prosthodontic aspect of osseointegration. Chicago: Quintessence Publishing Company Inc.; 1994